

BAYMEC PROLONG

Reg. Q-0715-172

Ivermectina antiparasitaria interna y externa de acción prolongada adyuvante en el control de garrapatas (Endectocida).

FÓRMULA:

Cada 100 ml contienen:

Ivermectina 1 g

Excipientes c.b.p. 100 ml

TIPO DE FORMULACIÓN: Solución inyectable.**INGREDIENTE ACTIVO:** Ivermectina**INDICACIONES:**

Baymec Prolong está indicado contra los siguientes parásitos internos y externos de bovinos de carne y leche, ovinos, caprinos y cerdos sensibles a la fórmula: **Parásitos gástricos rumiantes:** *Haemonchus placei*, *Ostertagia lyrata*, *Ostertagia ostertagi*, *Trichostrongylus* spp. **Parásitos intestinales:** *Cooperia* spp., *Trichostrongylus* spp., *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus* spp., *Bunostomum phlebotomum*, *Strongyloides* spp., *Toxocara vitulorum*. **Cerdos:** *Ascaris suum*, *Hyostomylus rubidus*, *Trichuris suis*, *Strongyloides ransomi*, *Oesophagostomum* spp. **Parásitos pulmonares:** **Bovinos de carne y leche:** *Dictyocaulus viviparus* **Cerdos:** *Metastrongylus* spp. **Larvas:** Larvas de *Dermatobia hominis* en todas sus fases. **Garrapatas:** *Boophilus microplus*, disminuye el número de hembras adultas y reduce la producción y viabilidad de los huevos. **Gusaneras:** Larva de *Cochliomyia hominivorax* productoras de miasis. **Moscas:** Controla las larvas de las moscas como *Haematobia irritans* reduciendo la infestación por adultos. **Parásitos renales:** *Sthepanurus dentatus*, **Sarna:** *Psoroptes* spp., *Sarcoptes* spp., *Chorioptes* spp.** **Piojos:** *Linognathus* spp., *Haematopinus* spp., *Solenopotes* spp., *Damalinia* spp.** ** Ayuda en su control.

VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS:

Bovinos de carne y leche, ovinos y caprinos: Administrar 1 ml por cada 50 kg de peso corporal (equivalente a 0.2mg/kg de peso vivo) por vías subcutánea o intramuscular.

Peso (kg)	Dosis (ml)	Peso (kg)	Dosis (ml)
Hasta 50 kg	1	301 - 350	7
51 - 100	2	351 - 400	8
101 - 150	3	401 - 450	9
151 - 200	4	451 - 500	10
201 - 250	5	501 - 550	11
251 - 300	6	551 - 600	12

Cerdos: Administrar 1ml por cada 33 kg de peso corporal (equivalente a 0.3mg/kg de peso vivo) por vías subcutánea o intramuscular.

Información complementaria:

Baymec Prolong además de tener un amplio espectro parasiticida puede ser administrado simultáneamente con las vacunas (en diferentes puntos de aplicación), tiene un amplio margen de seguridad inclusive para las hembras en cualquier fase de gestación y en animales recién nacidos.

- Formulación lipofílica que prolonga los días de protección.
- Limpia su ganado bovino y porcino de parásitos tanto por fuera como por dentro.
- Elimina parásitos gastrointestinales y pulmonares.
- Elimina miasis cutáneas y cavitarias, ácaros de la sarna, piojos y garrapatas.
- Más peso y mejor pelaje.
- Mayores ganancias.

ADVERTENCIAS:

Mantener el producto fuera de la luz solar. Incinerar los envases vacíos y/o con restos de producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. No administrar por vía endovenosa. **Baymec Prolong** presenta una turbidez cuando se almacena a temperaturas inferiores a 8°C, la cual es reversible una vez que el producto alcanza una temperatura superior; esta situación no afecta la calidad y eficacia del producto.

PERIODO DE RETIRO:

No administrar el producto 42 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano. No consumir la leche de vacas tratadas hasta 42 días después del último tratamiento. En vacas lecheras solo administrar en el periodo de secado.

ALMACENAMIENTO:

Consérvese entre 8°C y 30°C

USO VETERINARIO

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA

Elanco Salud Animal S.A. de C.V.

Boulevard Puerta de Hierro No.5153,
Piso 18, Col. Puerta de Hierro,
Zapopan C.P. 45116, Jalisco.
Tel.: 800 288 5553